




(51) Internationale Patentklassifikation 5 : C12N 15/13, C12P 21/08 C12Q 1/68, C07K 15/28 G01N 33/53		A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 93/01288 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. Januar 1993 (21.01.93)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP92/01524 (22) Internationales Anmeldedatum: 6. Juli 1992 (06.07.92)		(74) Anwalt: MÜLLER-BORE & PARTNER; P.O. Box 26 02 47, D-8000 München 26 (DE).	
(30) Prioritätsdaten: P 41 22 599.6 8. Juli 1991 (08.07.91) DE		(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IT, LU, MC, NL, SE).	
<p>(71) Anmelder (<i>für alle Bestimmungsstaaten ausser US</i>): DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-6900 Heidelberg (DE).</p> <p>(72) Erfinder; und</p> <p>(75) Erfinder/Anmelder (<i>nur für US</i>): BREITLING, Frank [DE/DE]; Am Schloßberg 49, D-6900 Heidelberg (DE). LITTLE, Melvyn [GB/DE]; Fritz-von Briesen-Str. 10, D-6903 Neckargemünd-Dilsberg (DE). DÜBELS, Stefan [DE/DE]; Quinckestr. 24, D-6900 Heidelberg (DE). BRAUNAGEL, Michael [DE/DE]; C 2, 1, D-6800 Mannheim 1 (DE). KLEWINGHAUS, Iris [DE/DE]; Richard-Wagner-Str. 30, D-6800 Mannheim (DE).</p>			

(54) Title: PHAGEMIDE FOR SCREENING ANTIBODIES

(54) Bezeichnung: PHAGEMID ZUM SCREENEN VON ANTIKÖRPERN



(57) Abstract

A phagemide has been constructed that expresses an antibody merged to coliphage pIII protein. The phagemide is suitable for selecting specific antibodies from large gene banks with small quantities of antigen. The antibody-pIII gene can be strongly repressed, so that it allows antibody banks to be amplified without the danger of deletion mutants predominating. After induction, large quantities of the merged protein may be expressed.

(57) Zusammenfassung

Ein Phagemid wurde konstruiert, das einen an Coliphagen pIII Protein fusionierten Antikörper exprimiert. Das Phagemid eignet sich zur Selektion von spezifischen Antikörpern aus großen Genbanken unter Verwendung kleiner Mengen Antigen. Das Antikörper-pIII-Gen kann stark reprimiert werden, so daß Antikörper-Banken ohne Gefahr einer Dominanz von Deletionsmutanten amplifiziert werden können. Nach Induktion können große Mengen des fusionierten Proteins exprimiert werden.

*LEDIGLICH ZUR INFORMATION*

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	FI	Finnland	MN	Mongolci
AU	Australien	FR	Frankreich	MR	Mauritanien
BB	Barbados	GA	Gabun	MW	Malawi
BE	Belgien	GB	Vereinigtes Königreich	NL	Niederlande
BF	Burkina Faso	GN	Guinea	NO	Norwegen
BG	Bulgarien	GR	Grüechenland	PL	Polen
BJ	Benin	HU	Ungarn	RO	Rumänien
BR	Brasilien	IE	Irland	RU	Russische Föderation
CA	Kanada	IT	Italien	SD	Sudan
CF	Zentrale Afrikanische Republik	JP	Japan	SE	Schweden
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SN	Senegal
CH	Schweiz	KR	Republik Korea	SU	Soviet Union
CI	Côte d'Ivoire	LI	Liechtenstein	TD	Tschad
CM	Kamerun	LK	Sri Lanka	TG	Togo
CS	Tschechoslowakei	LU	Luxemburg	US	Vereinigte Staaten von Amerika
DE*	Deutschland	MC	Monaco		
DK	Dänemark	MG	Madagaskar		
ES	Spanien	ML	Mali		

1

5

Phagemid zum Screenen von Antikörpern

10 Die vorliegende Erfindung betrifft Phagemide zur Selektion von spezifischen, aus großen Genbanken erhaltenen Antikörpern, die Herstellung dieser Phagemide und ihre Verwendung zur Selektion von spezifischen, aus großen Genbanken erhaltenen Antikörpern unter Verwendung geringer Mengen von Antigen.

20 Plasmid- und Phagen-Antikörper-Genbanken wurden in *E.coli* von PCR-amplifizierten Immunglobulin-Familien nach Immunisierung entwickelt. Rekombinante Antikörper gegen Immunogene wurden durch ELISA-Tests der Bakterienüberstände von isolierten Bakterienkolonien (Ward, E.S., Güssow, D., Griffiths, A.D., Jones, P.T. and Winter, G., "Binding activities of a repertoire of single immunoglobulin variable domains secreted from *Escherichia coli*", *Nature* (1989), 341, 544-546) oder durch Screenen von auf Nitrocellulose.

25 übertragenen Plaques von Bakterienkolonien auf Reaktivität gegen radioaktiv markierte Immunogene (Huse, W.D., Sastry, L., Iverson, S.A., Kang, A.S., Alting-Mees, M., Burton, D.R., Benkovic, S.J. and Lerner, R.A., "Generation of a large combinatorial library of the immunoglobulin repertoire in phage lambda," *Science* (1989), 246, 1275-1281) selektiert. Zur Selektion jedoch von spezifischen Antikörpern von Genbanken willkürlich kombinierter leichter und schwerer Ketten von nicht-immunisierten Tieren, bei 30 denen kein Übergewicht von Antikörpern für ein bestimmtes

35

-2-

1

Antigen vorliegt, ist ein Verfahren zum Screenen von Millionen von Antikörper-produzierenden Bakterien notwendig.

5

Ein möglicher Weg, einen großen Bereich von Antikörpern zu screenen, liegt darin, rekombinante Antikörper an die Oberfläche von Bakterien oder Bakteriophagen zu binden, sodaß sie dann rasch durch an eine feste Phase gebundene Antigene selektiert werden können. Hinsichtlich der 10 Schwierigkeiten, Proteine gezielt auf die Zelloberfläche von Bakterien zu bringen, ist die M13-Familie von filamentösen Bakteriophagen wegen ihrer kleinen Größe und ihres relativ einfachen genetischen Aufbaus ein verlockender Kandidat (vgl. Übersichtsartikel von Webster, R.E. and Lopez, J., in 15 "Virus Structure and Assembly", herausgegeben von S. Casjens, veröffentlicht von Jones and Bartlett Inc., Boston/Portola Valley, USA, 1985; Day, L.A., Marzec, C.J., Reisberg, S.A. and Casadevall, A., "DNA packaging in filamentous bacteriophages", Ann. Rev. Biophys. Chem. 20 (1988), 17, 509-539).

20

Das Produkt von Gen III (pIII) ist ein relativ flexibles und zugängliches Molekül, das aus zwei funktionellen Domänen zusammengesetzt ist; einer amino-terminalen Domäne, die an den F-Pili männlicher Bakterien während der Infektion bindet, und einer carboxy-terminalen, innerhalb des Virion verborgenen Domäne, die für die Morphogenese wichtig ist. Peptide können zwischen den zwei Domänen von pIII (Smith, G.P., "Filamentous fusion phage: novel expression vectors that display cloned antigens on the virion surface", Science 25 (1985), 228, 1315-1317) oder in der Nähe des N-Terminus (Parmley, S.F. and Smith, G.P., "Antibody-selectable filamentous fd phage vectors: affinity purification of target genes", Gene (1988), 73, 305-318) ohne Zerstörung 30 seiner Funktionen in Morphogenese und Infektion inseriert 35

-3-

1 werden. Nach erheblicher Pionierarbeit über die Verwendung  
von pIII in fd Phagen zum Führen fremder Peptide, zeigten  
Parmely and Smith (1988, vorstehend angegeben), daß  
5 Peptidepitope, die am amino-terminalen Ende inseriert sind,  
Phagen an immobilisierte Antikörper binden können. In Folge  
dieser Arbeit war es möglich, Peptid-Genbanken zu  
entwickeln, die man auf Bindung an Liganden und Antikörpern  
10 screenen kann (Scott, J.K. and Smith, G.P. "Searching for  
peptide ligands with an epitope library", Science (1990),  
249, 386-390; Devlin, J.J., Panganiban, L.C. and Devlin,  
P.E., "Random peptide libraries: A source of specific  
15 protein binding molecules", Science (1990), 249, 404-406;  
Cwirla, S.E., Peters, E.A., Barrett, R.W. and Dower, W.J.,  
"Peptides on phage, a vast library of peptides for  
identifying ligands", Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1990), 87,  
6378-6382).

20 McCafferty, J., Griffith, A.D., Winter, G. and Chiswell,  
D.J., "Phage antibodies: filamentous phage displaying  
antibody variable domains", Nature (1990), 348, 552-554  
berichteten über den Zusammenbau eines Antikörper-pIII-  
Fusionsproteins in einen fd-Phagen mit einem Tet<sup>R</sup>-Gen nach  
25 Insertion der Antikörper-DNA in das 5'-Ende von Gen III. Der  
Phage blieb infektiös und konnte durch Affinitäts-  
Chromatographie angereichert werden. Die Fusionsphagen  
zeigten sich jedoch hauptsächlich für relativ kleine Inserts  
30 als geeignet, wahrscheinlich weil die großen Inserts einen  
negativen Einfluß auf die Infektivität von pIII haben  
(Parmlee and Smith, 1988, vorstehend angegeben). Daher  
besteht ein großes Risiko, daß in Phagen-Genbanken nach  
ihrer Amplifikation schnell Deletionsmutanten dominieren.

35 Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,  
ein wirksameres Mittel zum Screenen von Antikörper-Genbanken

-4-

1

in Bakterien bereitzustellen.

5

Erfindungsgemäß wird dies durch ein Phagemid nach Anspruch 1 erreicht, das ein funktionelles Antikörper-pIII-Fusionsprotein exprimiert. Vorzugsweise ist der Antikörper ein Einzelketten-Antikörper.

10

15

20

25

DNA, die für ein Antikörper-pIII-Fusionsprotein, vorzugsweise ein Einzelketten-Antikörper-pIII-Fusionsprotein, codiert, wurde in ein Phagemid eingebaut. Ein großer Vorteil des erfindungsgemäßen Phagemid-Systems gegenüber McCafferty et al. (vorstehend angegeben) liegt darin, daß es als Plasmid vermehrt werden kann und nicht unter Selektionsdruck bezüglich der Entfernung von Antikörper-DNA steht, da die Expression des Fusionsproteins stark unterdrückt ist. Dies ist insbesondere während der Amplifikation der Antikörper-Genbanken wichtig, wenn schneller proliferierende Deletionsmutanten rasch dominant werden könnten. Die Phagemid DNA, die weniger als die Hälfte obiger Phagen DNA ausmacht, transformiert auch Bakterien effizienter. Darüberhinaus werden im Gegensatz zu obigem Phagensystem große Mengen der kleineren Phagemid DNA produziert und große Mengen von Antikörperprotein sind nach Induktion verfügbar, wodurch die Analyse stark erleichtert wird.

30

35

Die Expression des Antikörper-pIII-Fusionsproteins, insbesondere des Einzelketten-Antikörper-pIII-Fusionsproteins, unter Verwendung des pSEX-Phagemids und seiner Verpackung in virale Partikel erleichtert die Entwicklung bakterieller Systeme zur Isolierung von Antikörpern hoher Affinität. Millionen Antikörper-produzierende Klone von Antikörper-Genbanken kann man jetzt rasch durch Bindung an immobilisierte Antigene screenen. Ein weiterer Vorteil gegenüber herkömmlichen Verfahren zum Screenen liegt darin, daß nur kleine Mengen Antigen benötigt werden, ein

-5-

1 wichtiger Faktor, wenn der Vorrat eines seltenen Proteins  
begrenzt ist. Dieses System ermöglicht auch, zufällig  
mutierte Antikörper zu screenen, um ihre Bindungs-  
Affinitäten zu erhöhen. Das Verfahren kann mehrfach  
5 wiederholt werden, bis die gewünschte Spezifität erreicht  
ist. Es ist nun zum ersten Mal möglich, in großem Maßstab  
unterschiedliche Tests zum Screenen von verwandten Zellen  
und Organismen durchzuführen. Eine subtraktive Selektion,  
beispielsweise unter Verwendung von normalen und  
10 neoplastischen Zellen, kann zur Identifizierung von  
Tumor-assozierten Antigenen verwendet werden. Das  
Phagemid-System erweist sich auch als äußerst hilfreich für  
die Untersuchung molekularer Wechselwirkungen,  
beispielsweise durch Selektion von Antikörpern, die eine  
15 Liganden-Rezeptor-Bindung verhindern.

Ebenso erweist sich das erfindungsgemäße System als nützlich,  
andere Proteine oder Peptide an den Oberflächen von  
Phagemid-Viruspartikeln zu präsentieren. Hierfür ist die  
20 Antikörper-DNA nur durch die DNA des gewünschten Polypeptids  
zu ersetzen.

Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

25

#### Beispiel 1

##### Konstruktion eines Phagemids (pSEX)

30

DNAs, die für einen Einzelketten-Antikörper (scAb) und pIII  
codieren, wurden nach Insertion eines spezifischen Satzes  
von Restriktionsstellen und einer Protease-sensitiven  
Verbindungssequenz in die multiple Klonierungsstelle in pUC  
119 kloniert. Die Ab-DNA codierte für die variablen Domänen  
der schweren und leichten Kette eines humanisierten Ab gegen  
35 Hühnereiweiß-Lysozym, der von dem Anti-Lysozym Ab D1.3  
stammte (Amit et al., Science (1986), 233, 747-754;  
Verhoeven, M. et al., Science (1988), 239, 1534-1536). Diese  
Domänen wurden über eine 18-Aminosäure-Linker-Sequenz

-6-

1 verbunden, die das Epitop des monoklonalen Ab YOL1/34  
enthieilt (Breitling, F. and Little, M., "Carboxy-terminal  
regions on the surface of tubulin and microtubules: Epitope  
locations of YOL1/34, DM1A and DM1B", J. Mol. Biol. (1986),  
5 189, 367-370), wodurch der Ab identifiziert werden konnte.  
Zur Bereitstellung einer flexibleren Verbindung zu pIII,  
wurde das 3'-Ende der DNA für die leichte Kette durch Zusatz  
von Nucleotiden, die für die ersten sechs Aminosäuren der  
konstanten Domäne in der menschlichen Kappa-Kette codierten,  
10 gefolgt von einer BamHI-Restrictionsstelle modifiziert. pIII  
DNA wurde von dem Bakteriophagen M13 amplifiziert, indem  
Primer entsprechend der 5'- und 3'-Enden des Gens III  
verwendet wurden. Die Ab-pIII-DNA wurde dann in einem  
Phagemid der pDS-Familie kloniert, das einen mit zwei  
15 lac-Operatoren kombinierten Coliphagen-T7-Promotor enthielt  
(Bujard, H., Gentz, R., Lancer, M., Stüber, D., Müller,  
H.-M., Ibrahim, I., Häuptle, M.-T. and Dobberstein, B.,  
"A T5 promoter-based transcription-translation system for  
the analysis of proteins in vitro and in vivo", Methods  
Enzymol. (1987), 155, 416-433; Lancer, M. and Bujard, H.,  
20 "Promoters determine the efficiency of repressor action",  
Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1988), 85, 8973-8977; Müller,  
H.-M., Ph. D. thesis, Univ. Heidelberg, 1989). Schließlich  
wurde eine für die Leader-Sequenz des bakteriellen Enzyms  
25 Pektatlyase codierende DNA an das 5'-Ende der Ab-DNA  
ligiert, wodurch das Phagemid pSEX (Fig. 1a) erhalten wurde.  
Die Leader-, Linker- und PCR-Primer-Sequenzen sind in Figur  
30 1b gezeigt. Eine alternative Linker-Sequenz (Fig. 1c) mit  
dem YOL1/34 Epitop am Ende des Linkers, die eine nützliche  
Restriktionsstelle zur Insertion von Ab-Genbanken enthielt,  
wurde auch verwendet. Obwohl beide tag-Linker eine  
35 bedeutsame Menge saurer Reste enthielten, zeigten sie sich  
ohne Effekt auf die Herstellung von funktionellen scAbs im  
Vergleich mit scAbs, deren Linker nur aus den neutralen  
Aminosäuren Glycin und Serin zusammengesetzt waren.

1

Beispiel 2

5

Expression eines Antikörper-pIII-Fusionsproteins

10

Zur Überprüfung, ob der fertige Phagemid-Vektor in der Lage war, das Fusionsprotein in voller Länge zu exprimieren, wurden 100  $\mu$ l um IPTG einer sich in log-Phase befindlichen, mit pSEX transformierten E. coli-Kultur zugegeben. Die Kultur zeigte einen deutlichen Rückgang in ihrer Wachstumsrate, verglichen mit der Kontrolle, was auf eine bedeutsame Synthese eines Phagemid-codierten Proteins hinwies. In der Western-Blot-Analyse wurde das Antikörper-pIII-Konstrukt durch drei Antikörper identifiziert; einem monoklonalen Antikörper gegen einen Teil der Linker-Sequenz (EEGEFSEAR) und zwei Anti-Peptid-Kaninchenserien gegen N-terminale Sequenzen der schweren und leichten Ketten (QVQLQQSGGG bzw. DJQMTQSPSS). Es wanderte mit einem offensichtlichen Molekulargewicht von 93 kd (Fig. 2). Die große Größe des Fusionsproteins (vorausgesagt: Mr 68.100) ist höchstwahrscheinlich durch die pIII-Komponente (Mr 42.100) bedingt, die mit einem offensichtlichen Molekulargewicht von etwa 55.000 - 70.000 kd wandert (Goldsmith, M.E. and Königsberg, W.H., "Adsorption protein of the bacteriophage fd: isolation, molecular properties and location in the virus", Biochemistry (1977), 16, 2868-2694). Partielle Proteolyse des Fusionsprotein wurde durch das Vorliegen einiger schwächerer Banden niedrigeren Molekulargewichts angezeigt, die mit den drei Antikörpern identisch angefärbt wurden.

25

30

35

Eine Zellfraktionierung zeigte, daß das Protein in den Cytoplasma und Membran-Faktionen vorlag, nicht aber im Periplasma und dem Kulturüberstand (Fig. 2, Spuren 3-6) im Gegensatz zu der Antikörper-Komponente allein ohne pIII, die in das

-8-

1 Periplasma und das Medium sekretiert wurde (Daten nicht  
gezeigt). Dies war nicht überraschend, da pIII auf  
5 Phagenpartikeln aus der inneren bakteriellen Membran  
zusammengesetzt wird, ein Prozeß, der scheinbar nur von der  
C-terminalen Domäne abhängt. Deletionsmutanten von pIII ohne  
10 diese Domäne gelangen in das Periplasma, ohne an die  
cytoplasmatische Membran gebunden zu werden (Boeke, J.D. and  
Model, P., "A prokaryotic membrane anchor sequence: carboxyl  
terminus of bacteriophage f1 gene III protein retained in  
15 the membrane", Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1982), 79,  
5200-5204), und normale Phagenpartikel werden nicht  
zusammengesetzt (Crissman, J.W. and Smith, G.P., "Gene III  
protein of filamentous phages: evidence for a  
20 carboxy-terminal domain with a role in morphogenesis",  
Virology (1984), 132, 445-455). Die Anker-Sequenz ist  
wahrscheinlich eine hydrophobe Strecke von 23 Aminosäuren am  
Carboxy-Terminus (Davis, N.G., Boeke, S. and Model, P.,  
"Fine structure of a membrane anchor domain", J. Mol. Biol.  
25 (1985), 181, 111-121).

Die Fähigkeit des Fusionsproteins, ein Antigen zu binden,  
wurde untersucht, indem die Triton-lösliche Fraktion über  
eine an Sepharose gebundene Lysozymäule gegeben wurde.  
25 Western Blots des ungebundenen Materials und der nach  
gründlichem Waschen und Eluieren mit 0,05 M Dimethylamin  
erhaltenen Fraktionen zeigten, daß das Fusionsprotein in  
voller Länge tatsächlich spezifisch auf der Lysozymäule  
zurückgehalten wurde (Fig. 2, Spuren 7-12).

30

### Beispiel 3

#### Verpackung des pSEX-Phagemids

35

Zur Bestimmung, ob der Phagemid-Expressionsvektor verpackt  
werden konnte, wurden pSEX-enthaltende E.coli mehrfach mit

-9-

1

dem Phagen fd infiziert. IPTG wurde nicht zugegeben, da  
gefunden wurde, daß es einen inhibitorischen Effekt auf das  
Verpacken eines Phagemids hat. Ähnliches wurde kürzlich von  
5 Bass et al., Proteins (1990), 8, 309-314 berichtet, der ein  
Phagemid konstruierte, das ein Fusionsprotein aus humanem  
Wachstumshormon und der C-terminalen Domäne von pIII  
exprimierte. Die Untersuchung der Ab-pIII-Produktion mit und  
ohne IPTG nach Zugabe des Phagen fd zeigte, daß der Phage  
allein in der Lage war, eine Expression zu induzieren (Fig  
10 3). Eine mögliche Erklärung hierfür ist, daß eines der  
Phagen-Gen-Produkte die Bindung des lac-Repressors an den  
Operator stört. Andererseits könnte die Bindung von  
15 Phagen-Proteinen an die Zwischengenregion die Topologie des  
Phagemid beeinflussen und die Freisetzung des lac-Repressors  
bewirken. Wie auch immer, wir haben gefunden, daß das  
Durchwandern der Zwischengenregion  $10^3$  Nukleotide zu der  
anderen Seite des bla-Gens keinen Effekt auf dieses Phänomen  
hat (Daten nicht gezeigt).

20

Agarose-Gelelektrophorese der von Viruspartikeln in das  
Medium abgegebenen DNA zeigt zusätzlich zu der Einzelstrang-  
DNA von fd eine größere Menge kleinerer DNA, die in der  
Größe mit einzelsträngigem pSEX vergleichbar war. Ein  
weiterer Beweis für eine Phagemid-Verpackung und der  
25 Produktion von infektiösen Partikeln wurde durch Infektion  
von E.coli mit den abgegebenen Virus-Partikeln erbracht.  
 $10^{10}$  ml Amp<sup>R</sup> E.coli Kolonien wurden im Vergleich zu  
 $3 \times 10^9$  pfu erhalten.

30

Zur Bestimmung, ob das verpackte Phagemid das  
Antikörper-pIII-Fusionsprotein eingebaut hatte, wurden 90  
 $\mu$ l Kulturüberstand, der  $5 \times 10^8$  verpackte, als Amp<sup>R</sup>  
35 transduzierende Einheiten bestimmte Phagemide enthielt, mit  
einem tausend-fachen Überschuß an Wildtyp fd-Phage gemischt,

-10-

1

und über eine Säule immobilisierten Lysozyme gegeben. Nach gründlichem Waschen mit 10-fachem Badvolumen von PBS, 1 M NaCl bzw. 0,5 M NaCl in 0,1 M NaHCO<sub>3</sub> bei pH 8,3 wurden die Phagemid-Partikel mit 0,05 M Diethylamin eluiert. Das Eluat wurde mit 0,5 M NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub> neutralisiert und auf die Anzahl der Phagen und verpackten Phagemide getestet (Tabelle). Eine spezifische Anreicherung von bis zu 121-fach wurde erreicht, was den Einbau von funktionellen Antikörper-pIII-Konstrukten in die Phagemid-Partikel zeigte. Die Bindungseigenschaften der Phagemid-Partikel können weiter erhöht werden, indem eine pIII Deletionsmutante zum Verpacken verwendet wird. Dies garantiert, daß nur jene Phagemide, die für funktionelle Fusionsproteine codieren, verpackt werden und alle fünf pIII-Proteine auf einem Phagemid-Partikel mit Antikörper fusioniert werden.

10

15

#### Beschreibung der Figuren

20

Figur 1: Konstruktion von pSEX, einem Phagemid zum Screenen von Antikörpern

VH und VL sind variable Domänen der schweren bzw. leichten Kette eines Anti-Lysozym-Ab.

25

#### (a) Konstruktion

Zur Bereitstellung der notwendigen Restriktionsstellen,

wurden die Oligonukleotide

5'GCTGAATTCTGGATCCATAGGGCCCTCTAGAGTCGAC3'

5'AATTGTCGACTCTAGAGGGCCCTATGGATCCGAATTCTAGCTGCA3'

30

5'-phosphoryliert, miteinander hybridisiert und in pUC119

ligiert, der mit PstI und EcoRI geschnitten und

dephosphoryliert war. Gegebenenfalls wurden zur

35

-11-

1

Schaffung einer Protease-sensitiven Sequenz die  
hybridisierten Oligonucleotide 5'GATCCAAAGATATCAGAGGCC3'  
und 5'CTCTGATATCTTG3' zwischen die BamHI- und ApaI-Stellen  
des ersten Oligonucleotid-Satzes inseriert. scAB-DNA wurde  
dann zwischen die PstI- und BamHI-Stellen inseriert, gefolgt  
von der Ligierung der pIII-DNA über stumpfe Enden nach  
Spaltung des Phagemids mit ApaI und Behandlung mit  
T4-DNA-Polymerase zur Entfernung 3'-überhängender Enden.  
10 pSEX wurde hergestellt, indem die multiple Klonierungsstelle  
von pUHE 24-2 mit dem nahe verwandten Phagemid pDS31-1  
kombiniert wurde, das eine zusätzliche f1 Zwischengenregion  
enthieilt (Bujard et al., 1987, vorstehend angegeben; Müller,  
1989, vorstehend angegeben). die pDS31-1-Sequenz erstreckt  
15 sich von XbaI entgegen des Uhrzeigersinns bis zu einer  
HindIII-Stelle (in Klammern), die nach Ligierung über  
stumpfe Enden verloren wurde. pUHE24-2 ist im wesentlichen  
mit pDSG identisch (Bujard et al., 1987), bei dem ein  
Choli-Phage T7-Promotor mit zwei lac-Operatoren und einer  
20 Ribosomen-Bindungsstelle kombiniert ist (PAL/04/03, Lancer  
and Bujard, 1988, vorstehend angegeben; Lanzer, 1988,  
vorstehend angegeben). Das erhaltene Phagemid wurde mit  
HindIII geschnitten und die 5'-überhängenden Enden wurden  
25 mit Klenow-Fragment aufgefüllt. Nach einer weiteren Spaltung  
mit PstI, wurde das PstI-HincII Ab-pIII-DNA-Fragment in das  
Phagemid inseriert. Schließlich wurde eine synthetische DNA,  
die für die Leader-Sequenz des Bakterienenzym Pektatlyase  
und für die ersten vier Aminosäuren der schweren Kette  
30 codiert, zwischen die NcoI und PstI-Restriktionsstellen  
inseriert. pUHE-Plasmide wurden in E.coli 71-18 mit dem  
Plasmid pDM1, das den lac-Repressor exprimiert, vermehrt,  
pUC-Plasmide wurden in DH5 vermehrt und das  
Antikörper-pIII-Fusionsprotein in JM101 exprimiert.

-12-

1

(b) Sequenz der Ribosomenbindungsstelle (RBS), der Leader-Sequenz der Pektatlyase, des tag-Linkers und der PCR-Primer für pIII.

5

Unterstrichene Aminosäuren geben das Epitop für YOL1/34 an. Die folgenden Aminosäuren in der Linker-Sequenz sind eine Fortführung der -Tubulin-Sequenz.

10

(c) Mögliche tag-Linker-Sequenz.

Unterstrichene Aminosäuren geben das Epitop für YOL1/34 an. Die Aminosäuren des vorhergehenden Linkers sind eine Fortführung der Ab-Sequenz in die konstante Domäne.

15

Fig. 2: Induzierbarkeit, zelluläre Lokalisierung und Antigenbindung des Antikörper-pIII-Fusionsproteins, analysiert durch Gelelektrophorese auf 8 % Polyacrylamidgelen und Western Blott.

20

Spuren 1 und 2: Gesamte Zellen nach 1 h Inkubation mit 100  $\mu$ M IPTG (1) oder ohne IPTG (2).

Spuren 3 - 6: Zellfraktionierung; 3: Kulturüberstand, 4: periplasmatisch angereicherte Fraktion, 5: lösliche cytoplasmatische Fraktionierung, 6: 1 % Tritonextrakt.

25

Spuren 7 - 12: Lysozym-Affinitätschromatographie des 1 % Tritonextraktes von induzierten und nicht-induzierten Zellen, 7: Ausfluß (+IPTG), 8: Ausfluß (-IPTG), 9: letzte Waschung (+IPTG), 10: letzte Waschung (-IPTG), 11: Eluat (+IPTG), 12: Eluat (-IPTG).

30

Spuren 1 - 6 wurden angefärbt unter Verwendung des monoklonalen Antikörpers YOL1/34 (Serotec, Oxford, U.K.) und Spuren 7 - 12 unter Verwendung eines Antiserums gegen die N-terminale Sequenz der leichten Kette.

35

1

**Durchführung:**

Antiseren gegen die schweren und leichten Ketten wurden durch subkutane Injektion von Kaninchen mit den 5 amino-terminalen Peptiden QVQLQQSGGG(AC) bzw. DIQMTQSPSS(AC) erhalten, die an das Hämocyanin der Schlüsselloch-Napfschnecke gekoppelt waren. Zur Untersuchung der Expression des Fusionsproteins wurden pelletierte Bakterien von IPTG-induzierten Kulturen in 30 mM Tris/HCl, pH 8,0 10 Puffer resuspendiert, der 20 % Sucrose, 1 mM EDTA, 1 mg/ml Hühnerlysozym enthielt, und 10 min auf Eis inkubiert. Nach 1 minütiger Zentrifugation bei 15 000 g wurde der die 15 periplasmatischen Proteine enthaltende Überstand gesammelt und das Pellet in 0,1 M Tris/HCl, pH 8,0 beschallt. Die lösliche cytosolische Fraktion wurde nach 5 minütiger Zentrifugation bei 15 000 g abdekantiert und das 20 resuspendierte Pellet in 1 % Triton X100 inkubiert, wodurch die membrangebundene Fraktion erhalten wurde. Sämtliche Fraktionen wurden auf  $\beta$ -Lactamase-Aktivität gemäß Plückthun, 25 A. und Knowles, J.R.: "The consequences of stepwise deletions from the signal-processing site for  $\beta$ -lactamase", J.Biol. Chem. 262 (1987), 3951-3957 getestet, um die Effizienz des Fraktionierungsschrittes zu erfahren. Die tritonlösliche Fraktion wurde mit PBS 100-fach verdünnt, 30 bevor sie Affinitätssäulen zugegeben wurde. Zur Affinitäts-Chromatographie wurde Hühnerlysozym (Boehringer, Mannheim, FRG) mit Cyanogenbromid-aktivierter Sepharose (Pharmacia) gemäß den Anweisungen des Herstellers gekoppelt. Die Lysozym-Sepharose wurde 20 min bei Raumtemperatur mit 35 den Extrakten inkubiert und in Säulen gegossen, die nachfolgend mit 10 Bad-Volumina von PBS, 1M NaCl bzw. 0,5 M NaCl in 0,1 M NaHCO<sub>3</sub> bei pH 8,3 gewaschen wurden, bevor sie mit 0,05 M Diethylamin eluiert wurden. Sämtliche Fraktionen wurden mit Trichloressigsäure (Endkonzentration 20 %) präzipitiert und in SDS Polyacrylamidgelen aufgetrennt (Laemmli, U.K.: "Cleavage of structural proteins

-14-

1 during the assembly of the head of the bacteriophage T4".  
Nature (1970), 227, 680-685). Western Blots wurden gemäß  
Towbin, H Steahelin, T. and Gordon, I.: "Electrophoretic  
5 transfer of protein from polyacrylamide gels to  
nitrocellulose sheets: procedures and some applications",  
Proc. Natl. Acad. Sci. USA (1979), 76, 4350-4354,  
durchgeführt, indem zweite Antikörper, die an  
Meerrettich-Peroxidase gekoppelt waren, mit Diaminobenziden  
10 als Substrat verwendet wurden.

Fig. 3: Gelelektrophorese von zirkulärem einzelsträngigen  
pSEX

15 Spur 1: fd, Spur 2: Kontroll-Phagemid pUHE31-1 mit fd,  
Spur 3: pSEX1 mit fd.

20 DNA von fd Virionen und verpackte Phagemid-Partikel wurden  
auf 0,8 % Agarosegele in 1xTBE gemäß Sambrook, J., Fritsch,  
E.F. und Maniatis, T. in "Molecular Cloning: A Laboratory  
Manual, "2. Auflage, herausgegeben in Cold Spring Harbor  
Laboratory (1989) gegeben und mit Ethidiumbromid angefärbt.

25 Durchführung:  
Zur Herstellung verpackter Phagemide wurden pSEX1  
enthaltende E. coli JM101 auf M9 Minimalmedium ausplattiert  
30 und 30 h bei 37°C inkubiert. 2 ml des gleichen Mediums  
wurden mit einer der Kolonien angeimpft und bei 37°C unter  
kräftiger Belüftung inkubiert, bis eine optische Dichte von  
etwa 0,2 bei 600 nm erreicht wurde. 0,5 ml LB-Medium und ein  
10-facher Überschuß des Phagen fd wurden dann der Kultur  
35 zugegeben und diese weitere 3 h bei 37°C inkubiert. Nachdem  
zweimal vorsichtig bei 15 000 g 5 min lang bei Raumtemperatur

-15-

1

zentrifugiert worden war, wurde der Überstand auf eine  
Endkonzentration von 4 % Polyethylenglykol (Serva PEG 6000)  
und 0,5 M NaCL eingestellt und über Nacht bei 4°C stehen  
gelassen. Die Phagemide wurden durch 20 minütige  
Zentrifugation bei Raumtemperatur und 15 000 g sedimentiert  
und in 200,ul Tris-EDTA-Puffer, pH 7,5 suspendiert.  
Phagemid DNA wurde durch zehnminütiges Schütteln mit einem  
Volumen Phenol, gefolgt von einer Behandlung mit  
10 Chloroform-Isopropanol und Präzipitation mit Isopropanol  
präpariert (Sambrook, J., Fritsch, E.F. and Maniatis, T., in  
"Molecular Cloning: A Laboratory Manual", 2. Auflage,  
herausgegeben in Cold Spring Harbor Laboratory (1989)).

15

20

25

30

35

## TABELLE

Spezifische Anreicherung von verpackten Phagemiden an einer Antigen-Affinitätsäule

Gesamtes Volumen (ml)	Plattiertes Volumen ( $\mu$ l)	Amp Kolonien Zahl	Gesamt Volumen ( $\mu$ l)	Plattiertes Volumen ( $\mu$ l)	Gesamt pfu Zahl	Gesamt pfu	Überschuß pfu/Amp	Anreicherungsfaktor
Aufgetragen 10	$10^{-3}$	51	$5,1 \times 10^8$	$10^{-6}$	45	$4,5 \times 10^{11}$	882	—
Eluiert 1,1	$10^{-1}$	26	$2,9 \times 10^5$	$10^{-2}$	19	$2,1 \times 10^6$	7,3	•121

-16-

1

- 17 -

5

## Patentansprüche

1. Phagemid mit einer für ein Fusionsprotein aus einem Antikörper und einem Coliphagen pIII-Protein codierenden DNA, dadurch gekennzeichnet, daß das Fusionsprotein das Coliphagen pIII-Protein in voller Länge umfaßt.
2. Phagemid nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Antikörper ein Einzelketten-Antikörper ist.
3. Phagemid nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Fusionsprotein zwischen dem Antikörper und dem Coliphagen pIII-Protein einen Protease-sensitiven Bereich enthält.
4. Phagemid nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekennzeichnet, daß es die Struktur von Fig. 1 hat.
5. Verfahren zur Herstellung eines Phagemids nach Anspruch 1, bei dem eine für einen Antikörper codierende DNA mit einer für ein Coliphagen pIII-Protein in voller Länge codierende DNA fusioniert und das erhaltene DNA Molekül in ein übliches Phagemid inseriert werden, wobei hierfür übliche DNA Rekombinationstechniken angewandt werden.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine für einen Einzelketten-Antikörper codierende DNA verwendet wird.
7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen den für den Antikörper und das Coliphagen pIII-Protein codierenden DNA Sequenzen eine Protease-sensitive Sequenz eingefügt wird.

- 18 -

1

8. Verwendung des Phagemids nach einem der Ansprüche 1 - 4 zur Selektion auf spezifische Antikörper aus Antikörper-Genbanken.

5

9. Verwendung des Phagemids nach einem der Ansprüche 1 - 4 zur Präsentation anderer Proteine oder Peptide auf der Oberfläche von Phagemid-Partikeln durch Austausch der den Antikörper codierenden DNA durch jene des gewünschten Proteins bzw. Peptids.

10


15

20

25

30

35



(b)

86 RBS → *pelB* leader  
 MetLysTyrLeuLeuProThrAlaAlaAlaGlyLeu  
GAATTCATTAAAGAGGAGAAATTAACTCCATGAAATACCTCTTGCCTACGGCAGCCGCTGGCTTG  
 EcoRI (NcoI)

151 → VH 523 → tag-linker  
 LeuLeuLeuAlaAlaGlnProAlaMetAlaGlnValGlnLeuGln...SerSerGluGluGly  
 CTGCTGCTGGCAGCTCAGCCGGCGATGGCGCAAGTCACTGAG...TCTCAGAAGAACGGT  
 PstI

538 → VL 895  
 GluPheSerGluAlaArgGluAspMetAlaAlaLeuGluLysGlyAspIle...LysArgThr  
GAATTCTCAGAAGCTCGTGAAGATATGGCTGACTTGAGAAAGGTGATATC...AACACGTACG  
 EcoRI EcoRV

904 → M13 gene III  
 ValAlaAlaProGlySerLysAspIleArgAlaGluThrValGluSerCys...  
 GTAGCAGCTCTGGATCCAAAGATATCAGAGCTGAAACTGTTGAAAGTTGT...  
 BamHI EcoRV forward primer

(c)

526 → tag-linker

SerGluSerAlaSerAlaProLysIleGluGluGlyGluPhe

TCAGGGAGGGCATCCGGCCCCAAAGCTTGAAGGAGGGTGAATTCT

526 → tag-linker → VL  
 SerGlySerAlaSerAlaProLysLeuGluGluGlyGluPheSerGluAlaArgGluAspIle  
 TCAGGGAGTGCATCGCCCCAAAGCTTGAAGAAGGTGAATTCTCAGAACGCGCCGAAGATATC  
 HindIII      EcoRI      BssHII      EcoRV


Fig. 1

Fig.1

Fig. 1

2/3

Fig. 2



ERSATZBLATT

3/3




Fig. 3

ERSATZBLATT

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP 92/01524

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

Int. Cl. 5: C12N 15/13; C12P 21/08; C12Q 1/68; C07K 15/28; G01N 33/53

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int. Cl. 5: C12N; C07K; G01N; C12P

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	NATURE Vol. 348, 6 December 1990, MACMILLAN JOURNALS LTD., LONDON, UK; pages 552 - 554 J. MCCAFFERTY ET AL. 'Phage antibodies: filamentous phage displaying antibody variable domains' (cited in the application) see page 552, right column, line 1 - page 554, right column, line 30; figure 1 ----	1,2,5,6, 8,9
Y	----- -----	1,3,5,7

 Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.

## \* Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed
- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

24 SEPTEMBER 1992 (24.09.92)

Date of mailing of the international search report

12 OCTOBER 1992 (12.10.92)

Name and mailing address of the ISA/

EUROPEAN PATENT OFFICE

Facsimile No.

Authorized officer

Telephone No.

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP 92/01524

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	<p>NATURE            Vol. 341, 12 October 1989, MACMILLAN            JOURNALS LTD., LONDON, UK;            pages 544 - 546            E.S. WARD ET AL. 'Binding activities of a            repertoire of single immunoglobulin            variable domains secreted from <i>Escherichia coli</i>'            (cited in the application)            see page 545, left column, line 23 -            line 24; figure 2</p> <p>-----</p>	1,3,5,7
X	<p>PROC. NATL. ACAD SCI.            Vol. 87, 1990, NATL. ACAD SCI., WASHINGTON,            DC, US;            pages 6378 - 6382            S.E. CWIRLA ET AL. 'Peptides on phage: a vast            library of peptides for identifying ligands'            (cited in the application)            see page 6378, right column, line 1 -            page 6380, right column, line 13;            figure 1</p> <p>-----</p>	1,9
X	<p>SCIENCE            Vol. 249, 27 July 1990, AAAS, WASHINGTON,            DC, US;            pages 386 - 390            J.K. SCOTT AND G.P. SMITH 'Searching for            peptide ligands with an epitope library'            (cited in the application)            see page 389, right column, line 3 -            line 33; figure 1</p> <p>-----</p>	1,9
P,X	<p>GENE            Vol. 104, No. 2, 15 August 1991, ELSEVIER            PUBLISHERS, N.Y., US;            pages 147 - 153            F. BREITLING ET AL. 'A surface expression            vector for antibody screening'            see page 149, right column, line 8 -            page 152, left column, line 13;            figures 1-4</p> <p>-----</p>	1,9
P,X	<p>WO, A, 9 209 690 (GENENTECH, INC.)            11 June 1992            see claims 1-52; figure 1</p> <p>-----</p>	1,9

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT  
ON INTERNATIONAL PATENT APPLICATION NO. EP 9201524  
SA 61471

This annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information. 24/09/92

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO-A-9209690	11-06-92	None	

## INT'L NATIONALER RECHERCHENBERICHT

PCT/EP 92/01524

Internationales Aktenzeichen

I. KLASSEKIFIKATION DES ANMELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen sind alle anzugeben)<sup>6</sup>

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC  
 Int.K1. 5 C12N15/13; C12P21/08; C12Q1/68; C07K15/28  
 G01N33/53

## II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE

Recherchiertes Mindestpräfikat<sup>7</sup>

Klassifikationssystem	Klassifikationssymbole			
Int.K1. 5	C12N ;	C07K ;	G01N ;	C12P

Recherchierte nicht zum Mindestpräfikat gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Sachgebiete fallen<sup>8</sup>

III. EINSCHLAGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN<sup>9</sup>


Art. <sup>10</sup>	Kennzeichnung der Veröffentlichung <sup>11</sup> , soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile <sup>12</sup>	Betr. Anspruch Nr. <sup>13</sup>
X	<p>NATURE    Bd. 348, 6. Dezember 1990, MACMILLAN    JOURNALS LTD., LONDON, UK;    Seiten 552 - 554    J. MCCAFFERTY ET AL. 'Phage antibodies:    filamentous phage displaying antibody    variable domains'    in der Anmeldung erwähnt    siehe Seite 552, rechte Spalte, Zeile 1 -    Seite 554, rechte Spalte, Zeile 30;    Abbildung 1</p> <p>---</p>	1,2,5,6, 8,9
Y	<p>---</p> <p>-/-</p>	1,3,5,7

<sup>6</sup> Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen<sup>10</sup> :

- <sup>"A"</sup> Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- <sup>"E"</sup> älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- <sup>"L"</sup> Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- <sup>"O"</sup> Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- <sup>"P"</sup> Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

- <sup>"T"</sup> Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- <sup>"X"</sup> Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als neu oder auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- <sup>"Y"</sup> Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erforderlicher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- <sup>"A"</sup> Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

## IV. BESCHEINIGUNG

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts
24. SEPTEMBER 1992	12. 10. 92
Internationale Recherchenbehörde EUROPAISCHES PATENTAMT	Unterschrift des bevoilichtigten Beauftragten HORNIG H. 

III. EINSCHLAGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN (Fortsetzung von Blatt 2)		Betr. Anspruch Nr.
Art	Kennzeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der maßgeblichen Teile	
Y	<p>NATURE  Bd. 341, 12. Oktober 1989, MACMILLAN  JOURNALS LTD., LONDON, UK;  Seiten 544 - 546  E.S. WARD ET AL. 'Binding activities of a  repertoire of single immunoglobulin  variable domains secreted from Escherichia  coli'  in der Anmeldung erwähnt  siehe Seite 545, linke Spalte, Zeile 23 -  Zeile 24; Abbildung 2  ---</p>	1,3,5,7
X	<p>PROC. NATL. ACAD. SCI.  Bd. 87, 1990, NATL. ACAD. SCI., WASHINGTON,  DC, US;  Seiten 6378 - 6382  S.E. CWIRLA ET AL. 'Peptides on phage: a  vast library of peptides for identifying  ligands'  in der Anmeldung erwähnt  siehe Seite 6378, rechte Spalte, Zeile 1 -  Seite 6380, rechte Spalte, Zeile 13;  Abbildung 1  ---</p>	1,9
X	<p>SCIENCE,  Bd. 249, 27. Juli 1990, AAAS, WASHINGTON,  DC, US;  Seiten 386 - 390  J.K. SCOTT AND G.P. SMITH 'Searching for  peptide ligands with an epitope library'  in der Anmeldung erwähnt  siehe Seite 389, rechte Spalte, Zeile 3 -  Zeile 33; Abbildung 1  ---</p>	1,9
P,X	<p>GENE  Bd. 104, Nr. 2, 15. August 1991, ELSEVIER  PUBLISHERS, N.Y., U.S.;  Seiten 147 - 153  F. BREITLING ET AL. 'A surface expression  vector for antibody screening'  siehe Seite 149, rechte Spalte, Zeile 8 -  Seite 152, linke Spalte, Zeile 13;  Abbildungen 1-4  ---</p>	1-9
P,X	<p>WO,A,9 209 690 (GENENTECH, INC.)  11. Juni 1992  siehe Ansprüche 1-52; Abbildung 1  -----</p>	1,9

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. EP 9201524  
SA 61471

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am  
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr. 24/09/92

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO-A-9209690	11-06-92	Keine	-----